


**OCTOBRE 2026**

## PRÉVISIONS DES PRÉCIPITATIONS POUR LE TRIMESTRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE-JANVIER 2026-27

### Dans le Pacifique sud-ouest

#### Probabilités de scénario de précipitations



PROGRAMME OF  
THE EUROPEAN UNION



IMPLEMENTED BY



### À Wallis-et-Futuna

Les cumuls trimestriels de précipitations devraient être déficitaires.

*Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.*


*Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des cumuls de précipitations sur Wallis-et-Futuna sont de l'ordre de :*

Novembre : 315 mm

Décembre : 375 mm

Janvier : 360 mm


#### Probabilités de scénario de précipitations



# PRÉVISIONS DES TEMPÉRATURES POUR LE TRIMESTRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE-JANVIER 2026-27

## Dans le Pacifique sud-ouest

### Probabilités de scénario de température



## À Wallis-et-Futuna

Pas de prévisibilité saisonnière concernant les températures.

*Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.*


*Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des températures minimales et maximales sur Wallis-et-Futuna sont :*

Novembre : 24,8°C / 30,5°C

Décembre : 25,0°C / 30,8°C

Janvier : 25,1°C / 31,0°C


### Probabilités de scénario de température



# PRÉVISIONS DES VENTS POUR LE TRIMESTRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE-JANVIER 2026-27

## Dans le Pacifique sud-ouest

### Probabilités de scénario de vent



## À Wallis-et-Futuna

Le vent devrait être plus fort qu'à l'accoutumée.

*Remarque : S'agissant de prévisions trimestrielles, cela n'exclut pas la possibilité qu'un mois isolé se comporte différemment de la tendance trimestrielle annoncée.*


*Pour situer ces prévisions, les normales mensuelles des vitesses de vent sur Wallis sont :*

Novembre : 12 km/h

Décembre : 12 km/h

Janvier : 12 km/h

### Probabilités de scénario de vent




# ENSO (El Niño Southern Oscillation)

## Situation actuelle

En octobre 2026, nous sommes sous l'influence d'un épisode El Niño qui a déjà atteint une forte intensité et qui continue de croître.

Indice océanique relatif Niño 3.4 (RONI) au cours des 24 derniers mois



## Prévisions d'ENSO

Cet épisode El Niño devrait atteindre son pic d'intensité en fin d'année (décembre), puis décroître ensuite.

Probabilités d'occurrence des différentes phases d'ENSO pour le trimestre novembre-décembre-janvier 2026

Phase La Niña  
0 %



Phase neutre  
0 %



Phase El Niño  
100 %



# DÉFINITIONS

**ENSO** (« El Niño Southern Oscillation ») désigne les modifications de la circulation atmosphérique dans le Pacifique équatorial ainsi que les anomalies de température de l'océan qui y sont associées. ENSO est la principale source de variabilité interannuelle des précipitations et des températures observée en Nouvelle-Calédonie durant la saison chaude (entre novembre et avril). Son influence sur le temps est moindre durant le reste de l'année. Pour plus d'explications sur les différentes phases de ce phénomène (neutre, El Niño et La Niña), rendez-vous sur les 3 articles dédiés : [Présentation du phénomène](#), [Les différentes phase et leurs conséquences](#), [La prévision du phénomène](#).

Au-delà d'ENSO, les pluies et les températures en Nouvelle-Calédonie sont aussi conditionnées par d'autres facteurs de forçage climatique de plus petite échelle spatio-temporelle, tels que la position de la ZCPS, le passage d'une MJO, le passage d'une perturbation australe ou tropicale ou de phénomènes pluvio-orageux. L'ensemble de ces éléments sont pris en compte pour produire des prévisions saisonnières. Les modèles de prévision permettent ainsi d'estimer, sous forme de probabilité, les tendances de pluie, de température, ou encore de vent, à l'échelle des trimestres à venir, et ce en comparaison aux normales de saison.

**Boîte Niño 3.4** : Pour surveiller l'océan Pacifique et identifier les phases El Niño, La Niña ou neutre, les climatologues utilisent de multiples indicateurs, notamment l'anomalie trimestrielle de la température de surface de l'océan Pacifique dans une zone appelée « boîte Niño 3.4 », qui est un rectangle de coordonnées 5°N/5°S – 120°W/170°W.

**Indice relatif Niño 3.4 (RONI)** : Jusqu'en 2021, pour identifier les phases d'ENSO, les climatologues utilisaient principalement les anomalies de température de surface de l'océan Pacifique dans la « boîte Niño 3.4 » par rapport aux valeurs climatologiques. Or, cette approche est devenue problématique dans le contexte actuel du réchauffement climatique car la climatologie elle-même varie trop vite. Pour remédier à ce problème, l'indice relatif Niño 3.4 fournit une indication sur l'anomalie de température dans la boîte Niño 3.4 par rapport à l'anomalie moyenne de température sur l'ensemble de la zone tropicale (20°N/20°S). Ainsi, cet indice permet de mesurer l'état d'ENSO en s'affranchissant du réchauffement climatique. Une définition complète de l'indice RONI est disponible dans cet article : [Defining El Niño indices in a warming climate](#).

**Normales** : On peut définir des valeurs dites « normales » pour différents paramètres météorologiques (température, précipitations, vitesse du vent, etc.) ; ces normales sont obtenues en effectuant la moyenne d'un paramètre considéré sur trente ans. Ces valeurs servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles peuvent être définies aux niveaux décadaire, mensuel, trimestriel ou annuel et permettent de mettre en évidence la tendance d'une décade, d'un mois, d'un trimestre ou d'une année : mois très arrosé, trimestre frais, année déficitaire en précipitations, etc.

# ÉDITION

Météo-France  
Direction Interrégionale en Nouvelle-Calédonie  
et à Wallis-et-Futuna  
5 rue Vincent Auriol  
BP M2  
98849 Nouméa cedex

**Météo-France est certifié ISO 9001**

☎ 27 93 00

✉ [contact.nouvelle-caledonie@meteo.fr](mailto:contact.nouvelle-caledonie@meteo.fr)

🌐 <https://www.meteo.nc>

Directeur de la publication : Frédéric ATGER

Conception et Réalisation : Division Climatologie